


— IMPULSANDO —

LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

¿Conoce el grado de bloqueo en el que se encuentra su paciente cuando la cirugía está finalizando?



**2 DE CADA 3 PACIENTES
SUFREN BLOQUEO
NEUROMUSCULAR RESIDUAL¹**



¿Sabía usted que el **92%** de los anestesiólogos cree que hace un uso adecuado de los bloqueantes neuromusculares?²

La encuesta relacionada al uso de bloqueantes neuromusculares fue completada por **1629 anestesiólogos de 80 países**

Los encuestados respondieron correctamente al **57%** de las preguntas.

Los anestesiólogos encuestados expresaron un exceso de confianza en sus conocimientos y en su manejo de bloqueantes neuromusculares. Cuando los profesionales de la salud están muy seguros de sus conocimientos sobre un procedimiento, es **menos probable que modifiquen su práctica clínica o busquen más orientación sobre su uso.**²

La utilización de **agentes reversores** del Bloqueo Neuromuscular reduce el riesgo de que aparezcan Complicaciones Pulmonares Postoperatorias^{3,4}, que incluyen, entre otras:

- INFECCIONES RESPIRATORIAS
- BRONCOESPASMO
- PNEUMOTORAX
- ATELECTASIA
- REINTUBACIÓN

**Evite las complicaciones pulmonares
postquirúrgicas en el paciente y
REVIERTA
EL BLOQUEO
NEUROMUSCULAR^{5,6}**

1. Leif Saager, Eric M. Maiese, Lori D. Bash, Tricia A. Meyer, Harold Minkowitz, Scott Groudine, Beverly K. Philip, Pedro Tanakag, Tong Joo Gan, Yiliam Rodriguez-Blanco, Roy Sotoj, Olaf Heisel. Recite-US. Journal of Clinical Anesthesia. 2019.

2. Naguib, M., et al. Anesthesiologists' Overconfidence in Their Perceived Knowledge of Neuromuscular Monitoring and Its Relevance to All Aspects of Medical Practice: An International Survey. Anesth. Analg. 128. 2019.

3. Park, S., et al. Intraoperative Anesthetic Management of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease to Decrease the Risk of Postoperative Pulmonary Complications after Abdominal Surgery. Journal of Clinical Medicine. 2020.

4. Martinez-Ubieto J, Ortega-Lucea S, Pascual-Bellosta A, Arazo-Iglesias I, Gil-Bona J, Jimenez-Bernardó T, Muñoz-Rodríguez L. Prospective study of residual neuromuscular block and postoperative respiratory complications in patients reversed with neostigmine versus sugammadex. Minerva anestesiológica. 2016 Jul;82(7):735-42.

5. Residual neuromuscular block remains a risk with high clinical relevance and current practice is inadequate to monitor safe emergence from anesthesia. Our observations suggest current practice of monitoring of NMB and its reversal can be improved.

6. The recent introduction of a novel NMB reversal agent (i.e., sugammadex) has the potential to reduce the incidence of rNMB. Recent literature demonstrates a reduced incidence of rNMB when novel NMB reversal agents (i.e., sugammadex) are used. This further supports that rNMB is a preventable event.

La información contenida en este correo electrónico está destinada exclusivamente a Profesionales de la Salud debidamente habilitados y no debe bajo ninguna circunstancia copiarse ni distribuirse a cualquier otra persona que no sea usted.

Recibió este correo electrónico porque usted aceptó recibir información de su representante de MSD.

Si ya no desea recibir estas comunicaciones dé [clic aquí](#).

Conozca nuestra [política de privacidad](#), [aviso de privacidad](#) y nuestros [términos y condiciones](#) de uso